

UPPER ENDOSCOPY INSTRUCTIONS

Su endoscopia superior ha sido programada para el: _____

Hora de llegar a la recepción del HOSPITAL: _____

La hora de llegada antes del procedimiento permite el papeleo y la preparación.

**** Por favor, traiga sus tarjetas de seguro y una identificación con foto. Si tiene algún cambio de seguro, háganoslo saber lo antes posible ANTES del día de la cirugía.**

¿Qué es una endoscopia alta??

Una endoscopia superior o EGD es un examen especial de la zona gastrointestinal superior. Le permitirá al médico evaluar su esófago y estómago. Se pueden tomar biopsias y fotografías con fines diagnósticos. Se le colocará una vía intravenosa y recibirá medicamentos que lo harán sentir somnoliento. También se le aplicará un aerosol en la garganta que la adormecerá. Se le pedirá que se acueste sobre su lado izquierdo para este procedimiento. Después del procedimiento, se le monitoreará durante aproximadamente una hora y luego se le permitirá irse a casa con su conductor. Los informes de la biopsia tardarán varios días y se le hará una llamada telefónica de seguimiento para obtener estos resultados.

Preparación para la endoscopia alta

La noche anterior a la endoscopia alta _____ Evite comer o beber después de la medianoche. Puede tomar cualquier medicamento matutino con un sorbo de agua, o puede llevarlos consigo para tomarlos después de que haya terminado.

El día de su procedimiento , no coma ni beba nada. Esto incluye agua, goma de mascar y caramelos duros. Tome solo los medicamentos que le indicaron que tomara la mañana de su procedimiento. Tómelo con unos sorbos de agua, o puede traerlos con usted para tomarlos después de que finalice el procedimiento. Traiga una lista de sus medicamentos actuales y dosis al hospital. Quítate todas las joyas, incluidos los piercings en el cuerpo. Deje todos los objetos de valor, como tarjetas de crédito y joyas, en casa. NO podrá conducir hasta su casa. La medicación que le administramos le hará sentir somnoliento, lo que le impedirá conducir durante 24 horas. Su conductor puede esperar en nuestra sala de espera o regresar a recogerlo. Estará aquí aproximadamente 2-3 horas, pero a veces nuestro horario se retrasa debido a complicaciones imprevistas. Podría ser una espera más larga.

Qué esperar después de la endoscopia superior

El personal de cirugía del Centro de Salud Regional Kossuth le desea que le agradezca la oportunidad de servirle. Por favor llame si tiene alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, llame al 515-295-7714 y solicite una cirugía.

If you need to change or reschedule your surgery date, please call and let us know ASAP.

UPPER ENDOSCOPY INSTRUCTIONS

Medicamentos que puede necesitar dejar de tomar antes de su procedimiento: Notifíquenos si actualmente está tomando los siguientes medicamentos e infórmenos por qué le recetaron estos medicamentos. Le aconsejaremos que suspenda o haga ajustes a estos medicamentos o le pediremos que consulte con su médico de atención primaria o cardiólogo antes de su procedimiento.

Coumadin (Warfarina)	Aspirina	Gingko
Plavix (Clopidogrel)	Advil	Ginseng
Pradaxa (Dabigatrán)	Ibuprofeno	
Eficaz (Ticagrelor)	Excedrin	
Eliquis (Apixiban)	Motrin	
Aggrenox (Asprin/Dipiridamol)	Bufferin	
Persantina (Dipiridamol)	Aleve	
Xarelto (Rivaroxiban)	Naproxeno	
Productos para la tos y el resfriado	Efedra	
Medicamentos para la artritis recetados o de venta libre		

Por favor, deje de tomar estos medicamentos _____.

Tylenol y Tylenol Los productos para la artritis están bien para usar.

Pacientes diabéticos

Los pacientes que toman insulina deben seguir estas pautas. Debe controlar su nivel de azúcar en la sangre de 4 a 5 veces el día de su preparación. Tome su dosis matutina regular de insulina. Debe controlar su nivel de azúcar en la sangre antes de su dosis nocturna de insulina. Si su nivel de azúcar en la sangre es inferior a 150, no tome la dosis de la noche. Si su nivel de azúcar en la sangre es de 150 a 200, tome 1/2 dosis de insulina. Si su nivel de azúcar en la sangre es superior a 200, tome su dosis completa de insulina. **No se administre insulina el día de su procedimiento hasta después de que se haya realizado el procedimiento. Por favor, traiga su dosis matutina de insulina con usted.**

Si está tomando metformina u otros medicamentos orales para la diabetes, deberá guardar su dosis de la tarde la noche anterior a su procedimiento y llevar su dosis de la mañana con usted.